

癌症藥物治療(通用)

I. 簡介

癌症藥物治療的目的是殺死癌細胞、控制癌細胞增長和紓緩癌症所引起的病徵。

抗癌藥物有不同的種類，可以單獨使用，亦可結合使用，以加強療效。醫生會因應癌症的種類、病情、階段、基因變異等結果為您制定治療計劃。

您的藥物治療計劃包括：

- 化學治療（化療）：殺滅或抑壓癌細胞的生長和繁殖。
- 標靶治療：利用標靶藥物阻截癌細胞之間互相傳遞快速生長的信號，破壞癌細胞內部的運作，抑制癌細胞分裂生長，從而引發針對性療效。
- 免疫治療：透過藥物強化或補充自身免疫系統，從而讓免疫系統殺滅或抑壓癌細胞。
- 荷爾蒙治療：透過荷爾蒙分泌或改變其作用來控制那些需要依賴荷爾蒙生長的癌細胞。

II. 風險 / 副作用

- 不同的抗癌藥物會引起不同的副作用。在大部份情況下，透過適當的護理和輔助性藥物（如有需要）可以減少或預防藥物所引起的副作用。此外，大部份的副作用都是暫時性，當治療停止後，副作用便會逐漸消失。個別藥物的副作用，可以在治療完成後出現、持續或加劇。
- 以下是癌症藥物治療常見的副作用。副作用不能盡錄，詳情可參考個別抗癌藥物的資料：
 - 1) 化療：藥物除了針對癌細胞外，亦會影響體內生長快速的正常細胞，引發副作用。副作用會視乎每種藥物而定，而且因人而異。常見的副作用包括骨髓功能受損（可致免疫力下降、貧血或出血）、口腔潰瘍、嘔心、嘔吐、肚瀉、食慾不振、皮膚色素沉著、脫髮。化療也有機會引致罕見的繼發性惡性腫瘤。
 - 2) 標靶治療：副作用會視乎每種藥物而定，而且因人而異。
 - 3) 免疫治療：最常見的副作用有皮膚出疹，其次是疲倦、發燒、發冷、噁心等。此外，免疫治療也有機會引發不同器官的炎症（如肺部、腸臟、肝臟、胰臟、皮膚等），或影響荷爾蒙分泌。副作用會視乎每種藥物而定，而且因人而異。

- 4) 荷爾蒙治療：副作用相比其他治療輕微。女性服用者常見副作用有潮熱和經期失調。女性和男性服用者都有機會感到腸胃不適、性慾下降、疲倦、肌肉或關節痛。

注意:

- 治療藥物可以短暫性或永久影響患者的生育機能。如您希望生育，建議在接受治療前與伴侶一起和醫生商討。
- 在罕有情況下，抗癌藥物治療可導致嚴重併發症，甚至死亡。
- 接受藥物治療的效果各有差異，甚至未能達到預期效果。有些患者即使起初對治療有成效，但其後病情仍可能有變或轉差。
- 治療的反應和併發症因人而異，程度亦可能有別，建議您在決定治療前先跟醫護人員了解清楚。

III. 治療前預備

- 醫生會透過抽血結果和其他有關檢查，評估您的身體狀況是否適合接受治療，並解釋治療計劃。醫護人員也會建議您如何處理副作用。
- 部分藥物在醫管局藥物名冊裡是病人自購藥物，不屬標準收費範圍，病人須自費購買。藥物價格是根據市場價格釐定，隨來貨價浮動，恕不另行通知。部分藥物劑量是按病人體表面積、體重及病情計算，因人而異。藥物一經調製／配發，已繳付的藥費概不退還。

IV. 治療期間

- 大部份癌症藥物均為靜脈注射劑或口服藥，其他方法包括皮下注射（將藥液注入皮膚和肌肉之間的組織）、肌肉注射（藥物透過皮膚，注射進肌肉組織）和腦內／鞘內給藥（藥物注入腦內／脊柱內的腦脊髓液體）。因應情況，部份病人需要通過手術在身體植入中央靜脈導管作靜脈注射。如有需要，可徵詢醫護人員意見。
- 癌症藥物治療可在不同的地方進行，包括住院、在日間治療中心或在家中進行。無論您在哪裡接受治療，醫護人員都會為您提供協助及指引，幫助您順利地完成療程。
- 癌症藥物可以導致畸胎。故此，男性及女性病人（如適用）均應在治療期間至完成治療後最少半年內或按醫生指示，採取避孕措施。有關避孕方法可諮詢醫護人員。
- 治療期間，切勿服用療程計劃以外的抗癌藥（包括中成藥、草藥），以免產生不良反應。如果您採取了其他的治療方法，請保留這些治療藥物的名稱、劑量和服用時間，以作為記錄。

- 由於癌症藥物有可能會經母乳傳給嬰兒，治療期間和治療後六個月內，女性患者不宜餵哺母乳。

V. 療程完成後及覆診

- 醫生會安排覆診，跟進治療的效果及可能出現的副作用。
- 請依時覆診，並按照指示完成抽血化驗或其他相關檢查。請留意是否有感染徵狀，如有發燒或身體不適，應立即就醫。

VI. 備註

本單張只提供有關手術／醫療程序／治療檢查的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。不可預計的併發症亦偶有發生。不同病人的風險程度亦有所不同。如有查詢，請聯絡您的醫生。