

## 腹腔鏡胃底折疊術 Laparoscopic Fundoplication

### 簡介

胃底折疊術是治療藥物難治的嚴重胃食管反流病的外科手術。胃食管反流病的症狀包括反胃、嘔吐、餵食刺激反應、發育停滯及呼吸道問題。胃底折疊術有助消除或減輕胃食管反流病症狀，改善餵食情況。這項手術可以以微創或開放式進行，並可因應需要安排與胃造口術在同一節手術進行。

### 手術程序

手術程序須在全身麻醉下進行。視乎所選定的手術形式，會在病人身上開 4、5 個小孔（如屬腹腔鏡手術）或切開腹部（如屬開放式手術），以便於腹腔進行處理，移動胃食道接合部，經食管後路徑，以胃底部分壓緊胃食道接合部，減少胃內物倒流進食道。整個手術一般需要 2 至 3 小時。

### 風險

#### 常見風險／併發症

全身麻醉的併發症

1. 傷口感染
2. 傷口流血
3. 腹腔器官輕微受損
4. 乾嘔
5. 短暫吞咽困難
6. 迷走神經受損
7. 胃輕癱
8. 胃傾倒綜合症
9. 食道狹窄
10. 封皮移位／裂開
11. 胃食管反流病復發

#### 不常見嚴重後果風險

1. 腹腔器官嚴重受損
2. 食道穿孔
3. 死亡

### 手術前準備

病人在手術6小時前禁止飲食。

### 手術後護理

最快可以在手術24小時後恢復餵食（最終視乎實際臨床情況而定）。應小心觀察餵食接受度及是否有嘔吐症狀和腹痛。

### 覆診

病人應定期到專科門診診所覆診。

### 備註

本單張僅供參考，並無盡錄所有併發症。其他未能預見的併發症均有可能發生。某些類別病人面對的實際風險可能有所不同。如欲索取更多資料，請與你的醫生聯絡。