

## 甲下血腫引流術

### 簡介：

甲下血腫一般因手指或腳趾末梢受到鈍性創傷而引致，其形成是由於血塊積聚於指甲與甲床之間。當手指組織的直接傷害和甲下血腫做成的壓力增加時，都是導致痛楚的原因。

### 適用病症：

甲下血腫引流術，用於新創傷導致的甲下血腫(在四十八小時之內)，這個步驟是在患處「刺穿」一小孔以引流血腫。

### 不能接受手術的情況：

沒有。

少量的血腫或許不需引流。而由舊傷形成的已凝固血腫，不能有效引流。

在某些情況下，脫甲或修補甲床手術可改善指甲康復後的外觀。

若甲下血腫不是由創傷而引致，便不用做手術。

### 手術過程：

1. 先和病人溝通，解釋情況及取得同意。
2. 預備個人手術保護物品和電池運作之烙器。
3. 按病人需要，給與止痛藥或局部麻醉藥。
4. 清洗受傷部位。
5. 環鑽術：利用電池運作之烙器，在指甲上方以九十度穿孔，做引流。應避免傷及甲底和甲床位置。
6. 在一般情況下，血會流出，
7. 也可用手指輕力加壓，幫助引流。
8. 若有需要，可加穿一至兩個小孔，以徹底清除甲下血腫。
9. 包紮傷口

### 可能出現的併發症：

1. 血腫再次積聚
2. 感染
3. 甲片和甲床分離
4. 失丟指甲
5. 指甲變形

### 手術後注意事項：

1. 保持傷口清潔。
2. 切勿把指甲浸泡，引至感染。
3. 手術後小孔輕微滲血一至兩天，乃屬預期情況。
4. 血腫情況會於數星期續漸減退。
5. 若出現以下情況，應盡早求醫：感染如紅腫熱痛、發燒、血腫再次積聚、和痛楚增加。

### 備註：

手術後遺症出現與否，與創傷程度有很大關係。在同意進行手術前，病人必需清楚，並接受無論手術如何完善，上述後遺症仍然可以發生。由於沒有可能把所有風險或後遺症列出，以上只列出最常見及較重要之幾項風險。