

皮膚膿腫切開引流術

簡介:

當皮膚受到感染，在皮膚下積聚膿液，這種情況稱為膿腫。這些膿腫通常是由細菌感染引起，而少部份則由真菌感染導致。細菌感染的治療是使用抗生素。當抗生素有時不易穿過膿腫的外膜，便需要將膿腫切開，把膿液排出。切開引流術是指把受感染的皮膚膿腫切開並使膿液引導排出來的手術方法。

手術可能包括以下程序:

1. 將局部麻醉藥物注入膿腫四周，以減少手術時的痛楚。
2. 用消毒液把皮膚清潔乾淨。
3. 在膿腫表面的皮膚上作一個切口，把膿液排出。
4. 將膿腔以生理鹽水或消毒液清洗。
5. 把紗布放在膿腔內以防止膿液累積，並以敷料覆蓋傷口。

手術風險和併發症:

常見的風險和併發症:

1. 痛楚
2. 對局部麻醉藥的不良反應
3. 傷口流血
4. 疤痕
5. 膿腫再度形成

不常見的風險:

膿腫四周的重要組織如血管或神經線受損

手術後的護理:

1. 請跟指示定期到附近的家庭醫學診所進行傷口護理。
2. 如有需要，醫生會處方止痛藥及/或抗生素。
3. 手術後的短時間內，請避免傷口受到過度拉扯和活動，以防傷口出血。

備註:

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。不同類別病人的風險程度也會不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。