

傷口清創手術

手術性質

- 去除傷口內已壞死、受污染或受感染的組織。

適用病症

- 傷口含有已壞死、受污染或受感染的組織，並可能阻礙傷口癒合。

手術效益

- 去除已壞死、受污染或受感染的組織後，促進傷口的癒合，並減少併發症的機會。

手術過程

1. 清創手術可能需時頗長。
2. 手術須在局部麻醉或部位麻醉下進行。
3. 醫護人員會用手術刀或剪將傷口內已壞死、受污染或受感染的組織盡量清除。
4. 止血
5. 沖洗傷口及在有需要時把傷口縫合。

手術後注意事項

1. 遵從指示服用止痛藥及/或抗生素。
2. 依照安排的日期到普通科門診清洗傷口或拆線。
3. 如懷疑傷口出現問題，應盡早向醫生求助。

手術併發症

(由於沒有可能把所有併發症列出，以下只列出最常見及最重要的併發症)

1. 傷口流血。
2. 傷口感染。
3. 傷口因其他原因，癒合效果欠佳。

拒絕接受治療的後果

1. 傷口延遲癒合。
2. 繼發性感染。

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。不同類別病人的風險程度也會不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。