

## 傷口縫針

### 簡介:

皮膚傷口可由不同種類的傷害導致，最常見的是由硬物形成的鈍傷或利器形成的割傷。縫針是最常用的傷口縫合方法之一，這方法可加速傷口癒合和控制出血。至於所採用的傷口縫合方法通常取決於傷口的位置和狀況。

### 手術程序:

1. 以消毒液潔淨傷口。
2. 在傷口附近局部注射麻醉藥，以暫時消除痛楚的感覺。
3. 醫護人員會使用一種特殊的針和線把傷口對齊、縫合及打結。
4. 以敷料包紮/蓋護已縫合的傷口。

### 可能出現的風險和併發症:

1. 傷口疼痛和麻痺
2. 傷口感染
3. 傷口裂開
4. 對局部麻醉藥的過敏反應

### 重要的風險:

1. 神經線、血管及附近組織受傷
2. 對局部麻醉藥有嚴重過敏反應，可引致死亡。

### 手術後護理:

1. 請保持傷口及敷料乾爽，不要沾濕。如敷料被弄濕便需更換，請依指示到普通科門診部處理。
2. 如傷口在手或足部，將患處適當承高 24 至 48 小時，可減少痛楚及腫脹。
3. 如傷口在頭部，可於 48 小時後輕柔地洗頭，並用清潔毛巾把傷口印乾。
4. 除醫生特別指示外，一般傷口無需塗搽膏藥。
5. 如需拆線或清洗及檢查傷口，請依指示到普通科門診部處理。
6. 如出現傷口流血、傷口感覺麻痺、腫痛加劇、分泌物增加及發燒等感染跡象，請儘快到急症部或就近診所治理。
7. 根據醫生指示，接種破傷風的疫苗。

### 備註：

後遺症的出現與否，與創傷程度有很大關係。在同意進行手術前，病人必需清楚，並接受無論手術如何完善，上述之後遺症仍然可以發生。由於沒有可能把所有風險或後遺症列出，以上只列出最常見及較重要之幾項風險。