

清醒光纖插管 病人須知

簡介

本單張旨在介紹你準備接受的清醒光纖插管手術之基本資料。如你對這種手術有任何未在本單張內講及的疑問，請向你的麻醉科醫生查詢。麻醉科醫生樂意回答你的問題。

什麼叫插管?

當麻醉科醫生給你全身麻醉時，他通常會先讓你失去知覺，然後將一條氣管內導管放入你的氣管。這過程叫做插管。氣管內導管能夠當作通暢的呼吸氣道，以及用來輸送麻醉氣體。插管過程通常是十分安全的。

什麼叫清醒光纖插管?

在某些情況下，例如你的口部、顎部、喉嚨、頸部有問題的話，插管過程可能會發生困難。一旦麻醉科醫生先讓你失去知覺，之後插入氣管內導管程序失敗的話，你便有可能出現缺氧。


在該情況下，較安全的做法是在你清醒的時候，將氣管內導管插入你的氣管，然後對你進行全身麻醉，讓你熟睡。最常用的清醒插管方法，是清醒光纖插管。麻醉科醫生會在你仍然清醒的情況下，利用光纖支氣管窺鏡，引導將氣管內導管通過你的鼻孔或者嘴巴，插進你的氣管裏。

如何進行清醒光纖插管?

進行清醒光纖插管的過程可能會使病人感覺不舒服。所以，在插入氣管內導管插之前，麻醉科醫生會用局部麻醉劑使你的鼻孔、口腔、喉嚨一直至氣管感覺麻木，以便將不適感降至最低。施用麻醉劑的方法，可以是給你的鼻子、嘴巴、喉嚨塗上局部麻醉劑溶液或啫喱，或者在你的頸部進行注射。也可以通過光纖支氣管窺鏡，將局部麻醉劑輸入喉嚨和氣管。此外，麻醉科醫生也可以在有需要時，給你開鎮靜劑，讓你有睡意和放鬆。

之後，麻醉科醫生會先通過你的嘴巴或鼻孔，輕輕地將光纖支氣管窺鏡插進你的氣管，

再通過光纖支氣管窺鏡將氣管內導管移進你的氣管裏。待氣管內導管到達正確位置並且穩固放置後，便會對你進行全身麻醉。



進行清醒光纖插管有沒有風險?

一般來說，進行清醒光纖插管是很安全的。與這個程序有關的副作用和併發症可以分為十分常見或常見、罕見或十分罕見兩大類*。

十分常見或常見的副作用	罕見或十分罕見的併發症
喉嚨痛	缺氧
鼻孔出血	吸入異物
咳嗽	喉外傷
血壓改變	支氣管痙攣
脈搏改變	喉痙攣

備註

本單張僅供參考，並無盡錄所有併發症。其他未能預見的併發症均有可能發生。某些類別病人面對的實際風險可能有所不同。如欲索取更多資料，請與你的麻醉科醫生聯絡。

儘管採取了各種防範措施，有時還是難免出現併發症。在此情況下，你的麻醉科醫生會採取適當行動控制有關症狀。

*發生比率參考數據

十分常見	常見	不常見	罕見	十分罕見
每 10 宗有 1 宗	每 100 宗有 1 宗	每 1,000 宗 有 1 宗	每 10,000 宗 有 1 宗	每 100,000 宗 有 1 宗