

Facet Joint Block or Denervation 脊椎關節注射

簡介

脊椎關節位於脊骨骨節之間，和身體其他器官一樣，身體退化或受傷後，關節可能出現毛病，引起痛楚，甚至變成為慢性痛症。在這些關節內注射藥物，或在其神經線上加熱或急凍，皆可以紓緩痛楚。

如何生效？

這療法有三種途徑：

- (一) 在發炎的關節注射類固醇幫助消炎。
- (二) 注射局部麻醉劑止痛。
- (三) 用加熱或冷凍方法，把關節旁的神經線切斷，使痛楚無法傳遞。此療法效力較為持久。

如何進行？

- (一) 你有可能需要在治療前禁止飲食。
- (二) 手術一般只需局部麻醉。若有需要，醫生亦會給你鎮靜劑。
- (三) 首先醫生會在你手部放置靜脈套管。
- (四) 然後你需俯伏在手術床上。
- (五) 入針處經消毒後便進行局部麻醉。
- (六) 在 X 光輔助下，醫生把針插在適當部位。
- (七) 有需要的話，會注射少量顯影劑，以確保位置正確。
- (八) 入針時，你需固定身體，以免引致任何風險。
- (九) 接著便注射藥物到關節中，或用加熱或冷凍方法，把神經線切斷。
- (十) 因痛情需要，醫生可能要在多個關節下針。

有甚麼風險？

大部份都不普遍，情況亦不嚴重。

- (一) 在注射後你可能感到痛楚。
- (二) 傷及脊髓或其他神經線而引致下肢無力或癱瘓則較為罕見。
- (三) 把藥物注射到頸椎關節中引至休克，抽筋或停止呼吸則最為罕見。
- (四) 因注射時受細菌感染的機會是非常罕有的。

備註

本單張僅供參考，並無盡錄所有併發症。某些類別病人面對的實際風險可能有所不同。如欲索取更多資料，請與你的麻醉科醫生聯絡。