

心包穿刺術

簡介

心包積液乃指心臟外圍的薄膜有積水。成因包括細菌感染、發炎、惡性腫瘤、代謝疾病、充血性心力衰竭，創傷等等。心包積液會阻礙心臟擴張，引致功能受損。急性積液會導致急性肺水腫，休克或突發死亡。心包穿刺引流積液是經皮下穿刺介入方法。醫生通常使用心臟超聲波導引，放入引流管引出積液。

手術的重要性

心包穿刺引流積液有兩項功效。第一，積液清除後，心臟功能可回復正常。第二，積液的化驗有助瞭解病情。有急性積液時更需緊急穿刺引流。若拒絕是項手術，病者的病情會加速惡化。病者可選擇外科手術打開心包作另類治療。

手術過程

- 醫生會使用心臟超聲波以確定穿刺位置。通常是劍突位置以下，或心尖位置。
- 手術部位會進行消毒。
- 穿刺位置會進行局部麻醉。
- 醫生會將刺針刺入心包，並經刺針放入綱絲。再經綱絲放入引流管，引流管外接消毒容器。心包積液會被引流出體外。
- 積液會作進一步化驗以瞭解病因。

手術風險或併發症

- 此手術會有一定風險。
- 嚴重併發症 (2-4%) 包括死亡、心臟病發、心壁破穿、肝臟受損、氣胸及嚴重出血。

手術前準備

- 醫生會替你做心臟超聲波，以確定心包積液的位置，程度及臨床重要性。
- 醫生會詳細向你和你的親屬解釋是項手術的好處、施行過程及風險，而你需簽署手術同意書。
- 我們會監測你的血壓，心跳及心電圖。你亦可能需要靜脈輸液。
- 若手術乃非緊急，而你正服用薄血藥，可能需要於手術前數天停藥。如遇緊急情況，我們會使用特效藥以中和薄血藥性能。

手術後須知

- 引流管會持續保留，直至積液全部排出或心包再沒積液。可能需時數天。
- 醫生有可能移動引流管以方便積液排出。
- 醫生會利用心臟超聲波確定心包積液情況。

手術後跟進

- 引流管移除後，傷口會蓋上消毒紗布。請保持傷口清潔，沐浴時請避免弄濕紗布。如紗布被弄濕，請立即更換。
- 醫生會向你解釋手術結果及商討治療計劃。

備註

- 若病人不接受此項手術，本單張不能盡錄所有可產生後果。
- 此項手術可引致的危險或併發症亦未盡錄，不可預計的併發症亦偶有發生。某類病人的風險亦較高。
- 若有併發症發生，可能需要立即進行另一項緊急手術以作治療。
- 如有查詢，請聯絡你的醫生或護士。