

眼眶骨折修補手術

簡介

眼眶是保護眼球及其周邊軟組織的重要器官，會因為意外及各種原因受創傷而破裂，影響眼部功能。病人會因為感覺神經受傷而有眼眶周邊麻痺感覺，又或因眼眶壁破裂傷了眼外肌或眼外肌運動神經或眼外肌及其周邊組織夾在裂縫而引到複視。

醫生會根據病人的情況及受傷程度而決定觀察或在適當時候進行眼眶骨折修補手術。

手術過程

手術一般是全身麻醉進行:

- 以手術放鬆遭裂骨緊夾之眼外肌及其他組織，如有需要可以植入物料修補眼眶骨折部位
- 植入物料包括塑膠及金屬如鈦，醫生會根據病人的情況及受傷程度而選擇適合的植入物

由於病情有別，病人應於術前向醫護人員了解個別手術詳情。

手術風險或併發

- 全身麻醉之風險
- 一般眼眶手術之風險及可能出現之併發症如下：
 - 明顯的癍痕
 - 眼部浮腫，出現瘀血或積血
 - 斜視，複視持續或惡化
 - 眼瞼下垂
 - 眼窩出血
 - 眼窩脂肪萎縮引致眼球內陷
 - 術後感染：眼窩發炎，化膿
 - 持續性眼眶周邊神經感覺過敏或減退
 - 因植入修補物料引起之併發症如感染或外突
 - 失明
 - 腦部受損，腦液滲漏

手術可產生之併發症不能盡錄，詳情可請教醫生。

手術前準備

- 可能需要電腦掃描 / 磁力共振攝影及其他檢查
- 可能需要其他專科如外科，耳鼻喉科，矯形外科等跟進或同步治療
- 如有其他內科病需要長期服用西藥、長期服用中藥或健康食品，尤其服用抗凝血藥物、薄血丸等，必須預早通知醫生，並遵從醫生囑咐於手術前暫停藥物，以減低併發症或出血的風險。

手術後須知

- 手術後根據醫護人員之指示護理眼睛及傷口
- 根據醫生處方用藥
- 病人需要定期覆診

手術後跟進

- 可能需要接受電腦掃描 / 磁力共振及其他檢查以作跟進
- 可能需要其他專科如外科、耳鼻喉及矯形外科等跟進或同步治療

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。不可預計的併發症亦偶有發生。病人的風險程度亦因身體情況而各有不同。在手術期間如有必要醫生可能會施行特別的治療程序。如有查詢，請聯絡你的醫生。