

眼眶手術

簡介

眼眶是保護眼球及其周邊軟組織的重要器官，會因為各種病變或創傷而影響眼部功能。

較常見的眼窩及眼眶疾病包括:

- 眼窩腫瘤，炎症或感染
- 眼窩及眼眶骨折
- 甲狀腺相關眼病
- 其他

手術過程

手術一般是全身麻醉，在合適情況下會局部麻醉進行:

- 眼眶腫瘤切除及組織化驗：把眼眶腫瘤或眼眶疾病變組織全部或部分切除以作治療或組織化驗
- 眼眶骨折修補手術 + / - 植入修補物料：以手術放鬆遭裂骨緊夾之眼外肌及其他組織, + / - 以植入物料修補眼眶骨折部位
- 甲狀腺相關眼病：眼眶減壓手術 - 把部份眼窩壁或脂肪切除以擴大眼窩容量來達至眼眶減壓目的

由於病情有別，病人應於術前向醫護人員了解個別手術詳情。

手術風險或併發

- 局部或全身麻醉之風險
- 一般眼眶手術之風險及可能出現之併發症如下：
- 眼乾燥
- 明顯的癍痕
- 眼部浮腫，出現瘀血或積血
- 斜視，複視
- 眼瞼下垂
- 因眼窩出血關係眼球突出
- 眼窩脂肪萎縮引致眼球內陷
- 術後感染 - 眼窩發炎，化膿
- 持續性眼眶周邊神經感覺過敏或減退

- 眼窩腫瘤 - 因腫瘤性質關係未能完全將其切除
- 眼窩腫瘤 - 腫瘤再生，增生，擴散等。後者以惡性腫瘤可能性較大
- 眼窩及眼眶骨折 - 因植入修補物料引起之併發症如感染或外突
- 眼窩及眼眶骨折 - 手術後斜視，複視持續
- 失明
- 腦部受損，腦液滲漏

手術可產生之併發症不能盡錄，詳情可請教醫生。

手術前準備

- 可能需要電腦掃描 / 磁力共振攝影及其他檢查
- 可能需要其他專科如內科，外科，耳鼻喉科，矯形外科，腫瘤及放射性治療科等跟進或同步治療
- 如有其他內科病需要長期服用西藥、長期服用中藥或健康食品，尤其服用抗凝血藥物、薄血丸等，必須預早通知醫生，並遵從醫生囑咐於手術前暫停藥物，以減低併發症或出血的風險。

手術後須知

- 手術後根據醫護人員之指示護理眼睛及傷口
- 根據醫生處方用藥
- 病人需要定期覆診

手術後跟進

- 可能需要定期接受電腦掃描/磁力共振及其他檢查以作跟進
- 可能需要其他專科如內科，外科，耳鼻喉，矯形外科，腫瘤及放射性治療科等跟進或同步治療

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。不可預計的併發症亦偶有發生。病人的風險程度亦因身體情況而各有不同。在手術期間如有必要醫生可能會施行特別的治療程序。如有查詢，請聯絡你的醫生。