支氣管鏡檢查



圖. 正在進行支氣管鏡檢查

這是什麼檢查?

它是一個內窺鏡檢查。醫生會將支氣管鏡從鼻孔、口腔或者呼吸管放進，令醫生可以檢查病人的氣管及支氣管。

爲什麼要進行這個檢查?

- **進行治療:**
  - 清除因異物或滯留痰液引起的氣道堵塞
  - 為肺部／氣管／支氣管進行止血

- **取得診斷:**
  - 抽取痰液或肺部組織進行化驗（尋找細菌／病毒／癌症細胞）
  - 找出肺部／氣管／支氣管出血的位置
  - 找出胸部 X 光異常原因
  - 找出聲音沙啞的原因
  - 檢查呼吸管／氣管／支氣管有沒有阻塞

- **其他:**
  - 確定呼吸管的位置
  - 輔助進行氣管造口手術

怎樣進行這個檢查?

檢查前:

- **檢查前需要禁食**
- 抽血用作進行血氧含量和凝血指數分析
- 根據病人情況，檢查前可能需要禁食
- 病人如果有可移除的假牙，將會在檢查之前移除

檢查時:

醫護人員會進行以下程序：

- 緊密監察病人的維生指標，包括血壓、心跳及血含氧量等
- 為病人提供氧
- 需要時, 會在病人的鼻孔及口腔噴灑局部麻醉藥以減輕病人的不適或為病人注射鎮靜劑。
- 支氣管鏡將會通過鼻孔、口或呼吸管插入，經主氣管到達支氣管以進行檢查。醫生會抽取病人的痰液或肺組織作化驗，同時可以進行治療程序
- 病人在檢查可能出現咳嗽

檢查後:

- 根據醫生的決定，檢查後可能需要禁食一段時間
- 需要時，會進行胸部X光檢查以排除有關檢查的併發症
- 如果病人在檢查時有接受鎮靜劑注射，他可能會覺得嗜睡或頭暈，建議病人臥床休息
- 檢查後病人可能感覺輕微咽喉痛或咳嗽帶血絲

風險和併發症

一般風險:

- 檢查引起的不適（例如咳嗽，咽喉痛）
- 鎮靜劑的副作用（例如嗜睡，頭暈，血壓下降）或局部麻醉藥的副作用

特別風險:

- 氣胸
- 肺部／氣管／支氣管出血
- 病人呼吸狀況或會轉差
- 肺部感染
- 心律失常或誘發心臟病

不能進行程序的可能性

有一些情況會令到此程序不能順利進行，例如病人不能忍耐施行的程序，或出現一些風險和併發症，醫生需要終止程序。

其他治療選擇

病人如選擇不進行這程序，或會影響其整體病情，而病情的變化是受多種臨床因素影響，包括個別病人發病前的身體狀況、病情種類、對治療的反應及進展等。醫生會向你解釋其他合適的選項。

免責聲明

本冊子提供的資訊僅供一般參考，上列風險及併發症未能盡錄，有關詳情請與您的主診醫生商討。