

## 支氣管鏡檢查



圖. 正在進行支氣管鏡檢查

### 這是什麼檢查?

它是一個內窺鏡檢查。醫生會將支氣管鏡從鼻孔、口腔或者呼吸管放進，令醫生可以檢查病人的氣管及支氣管。

### 為什麼要進行這個檢查?

- 進行治療:
  - 清除因異物或滯留痰液引起的氣道堵塞
  - 為肺部／氣管／支氣管進行止血
  
- 取得診斷:
  - 抽取痰液或肺部組織進行化驗（尋找細菌／病毒／癌症細胞）
  - 找出肺部／氣管／支氣管出血的位置
  - 找出胸部 X 光異常原因
  - 找出聲音沙啞的原因
  - 檢查呼吸管／氣管／支氣管有沒有阻塞
  
- 其他:
  - 確定呼吸管的位置
  - 輔助進行氣管造口手術

## 怎樣進行這個檢查?

### 檢查前:

- 抽血用作進行血氧含量和凝血指數分析
- 根據病人情況，檢查前可能需要禁食
- 病人如果有可移除的假牙，將會在檢查之前移除

### 檢查時:

醫護人員會進行以下程序：

- 緊密監察病人的維生指標，包括血壓、心跳及血含氧量等
- 為病人提供氧氣
- 在病人的鼻孔及口腔噴灑局部麻醉藥以減輕病人的不適
- 需要時，為病人注射鎮靜劑
- 支氣管鏡將會通過鼻孔、口或呼吸管插入，經氣管到達支氣管以進行檢查，醫生會抽取病人的痰液或肺組織作化驗，同時可以進行治療程序，病人可能出現咳嗽

### 檢查後:

- 根據醫生的決定，檢查後可能需要禁食一段時間
- 需要時，會進行胸部X光檢查以排除有關檢查的併發症
- 如果病人在檢查時有接受鎮靜劑注射，他可能會覺得嗜睡或頭暈，建議病人臥床休息
- 檢查後病人可能感覺輕微咽喉痛或咳嗽帶血絲

## 風險和併發症

### 一般風險:

- 檢查引起的不適（例如咳嗽，咽喉痛）
- 鎮靜劑的副作用（例如嗜睡，頭暈，血壓下降）或局部麻醉藥的副作用

### 特別風險:

- 氣胸
- 肺部／氣管／支氣管出血
- 病人呼吸狀況或會轉差
- 肺部感染
- 心律失常或誘發心臟病

### 不能進程序的*可能性*

有一些情況會令到此程序不能順利進行，例如病人不能忍耐施行的程序，或出現一些風險和併發症，醫生需要終止程序。

### 其他治療選擇

病人如選擇不進行這程序，或會影響其整體病情，而病情的變化是受多種臨床因素影響，包括個別病人發病前的身體狀況、病情種類、對治療的反應及進展等。醫生會向你解釋其他合適的選項。

### 免責聲明

本冊子提供的資訊僅供一般參考，上列風險及併發症未能盡錄，有關詳情請與您的主診醫生商討。